

โรคพิษสุนัขบ้า (โรคกลัวน้ำ)

เกิดจาก

เชื้อไวรัสเรบีส์ สัตว์นำโรค ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ทั้งสัตว์เลี้ยง และสัตว์ป่า เช่น สุนัข แมว กระต่าย กระต๊อ ลิง ชะนี วัว และควาย เป็นต้น สัตว์นำโรคที่สำคัญที่สุดคือ สุนัข



การติดต่อ

- ✓ ถูกสัตว์ที่เป็นโรคนี้อัดหรือข่วน
- ✓ ถูกสัตว์ที่เป็นโรคนี้อุ้ยหรือน้ำลายสัตว์ กระเด็นเข้าแผลรอยขีดข่วน หรือ จมูก ปาก และตา
- ✓ ติดต่อดูดนมจากเต้านม สัตว์ป่วยที่มีจำนวนไวรัส ในอากาศเป็นจำนวนมาก เช่น ในถ้ำค้างคาว
- ✓ ติดต่อดูดนมจากเต้านมสัตว์ที่ตายจากโรคพิษสุนัขบ้า

อาการป่วย ที่พบในคน



มีไข้



เจ็บคอ



อ่อนเพลีย



คันบริเวณแผล



กลัวแสง / กลัวลม



เบื่ออาหาร



กระวนกระวาย



กลัวน้ำ



หมดสติ



หายใจขัด

เสียชีวิต

*** ปัจจุบันยังไม่มียารักษา
ติดเชื้อแสดงอาการ
เสียชีวิตทุกราย



พิษสุนัขบ้า ฆ่าได้ ทุกชีวิต



คำแนะนำ

เมื่อถูกกัด ฉีดยา วัคซีน เลี้ยง

คำแนะนำเมื่อถูกกัด ช่วน เลี้ยง



ล้างแผล

ด้วยสบู่ และน้ำสะอาด
อย่างเบาๆ หลายๆ ครั้ง



ไปพบแพทย์

เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง
และมาตามนัดทุกครั้ง



ใส่ยา

ใส่ยาเบตาดีน
บริเวณที่ถูกกัด ช่วน



กักหมา และแมว

เพื่อสังเกตอาการ 10 วัน หากตาย
ให้รีบส่งตรวจหาเชื้อพิษสุนัขบ้า



ฉีดวัคซีน

ฉีดวัคซีนต่อให้ครบชุด
และตรงตามนัด



คำแนะนำสำหรับผู้เลี้ยง

- ✓ นำสุนัข หรือแมวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี
- ✓ เลี้ยงในรั้วบ้าน ออกนอกบ้านต้องใช้สายลากจูง
- ✓ ฝึกให้เชื่อฟังคำสั่ง
- ✓ กำหมั่นคุมกำเนิด

