

# เมื่อถูกสุนัข กัด ช่วน เลียบาดแผล ต้องรีบ



**ล้างแผล** ด้วยสบู่และ  
น้ำสะอาดอย่างเบาๆ หลายๆ ครั้ง



**ใส่ยา** เบตาดีน



**กักหมา** ไว้ดูอาการ 10 วัน



**หาหมอ** เพื่อรับการป้องกัน  
ที่ถูกต้อง และมาตามนัดทุกครั้ง

**ถูกสุนัขกัด**  
**ต้องล้างแผล ใส่ยา**  
**กักหมา หาหมอ**  
**ฉีดวัคซีนต่อให้ครบชุด**

## คำแนะนำ สำหรับคนเลี้ยงสุนัขและแมว

**ฉีดวัคซีน** ป้องกัน  
โรคพิษสุนัขบ้าทุกปี

เลี้ยงในรั้วบ้าน  
**ระวัง!** อย่าให้  
ไปกัดคนอื่น



**ทำหมัน** ไม่ให้  
มีลูกมากเกินไป

## กาตา 5 ย กับสุนัขกัด



**อย่า**  
**เหยย** ให้สุนัขโมโห



**อย่า**  
**เหยยบ** หาง หัว ตัว ขา  
ให้สุนัขตกใจ



**อย่า**  
**แยก** สุนัขที่กัดกัน  
ด้วยมือเปล่า



**อย่า**  
**หยยบ** อาหารที่สุนัข  
กำลังกิน



**อย่า**  
**ยุ่ง** กับสุนัขที่ไม่รู้จัก  
หรือไม่มีเจ้าของ



**โรคพิษสุนัขบ้า**  
**อันตรายถึงตาย**  
**หากไม่ได้ฉีดวัคซีน**





# โรคพิษสุนัขบ้า

เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน  
เกิดจากเชื้อไวรัส เป็นได้  
ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด



แต่ !!

สัตว์นำโรคที่สำคัญ คือ



สุนัข



แมว

## ! กลุ่มเสี่ยง

คนที่ถูกหมากัด ข่วน  
เลียบาดแผล แล้วไม่ไป  
ฉีดวัคซีน



## การติดต่อ

ถูกสัตว์ที่มีเชื้อ กัด ข่วน เลียบาดแผล



## ดูอย่างไร ว่าสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

ระยะเริ่มแรก



นิสัยเปลี่ยน ไม่ร่าเริง หงุดหงิด  
เก็บตัว หวาดระแวง



ระยะต้นตอ



กระวนกระวาย กัดไม่เลือก  
เท่าหอน



ระยะอันตราย



น้ำลายไหล คางห้อยตก  
ล้มลง ตาย



## ความรู้ที่มักเข้าใจผิด



❌ สุนัขที่มีเจ้าของหรือลูกสุนัข มักไม่เป็น  
โรคพิษสุนัขบ้า

✅ สุนัขที่มีเจ้าของหรือลูกสุนัข หากไม่ได้  
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ก็เป็นบ้าได้



❌ โรคพิษสุนัขบ้าเป็นได้เฉพาะหน้าร้อนเท่านั้น

✅ โรคพิษสุนัขบ้าเป็นได้ทุกฤดู



❌ โรคพิษสุนัขบ้าเมื่อมีอาการแล้ว  
รักษาให้หายได้

✅ โรคพิษสุนัขบ้าเมื่อมีอาการแล้ว  
“รักษาไม่หาย ตายทุกราย”